

**GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
ALBERT CHENEVIER - HENRI MONDOR**

51 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 94010 CRETEIL Cedex

Contact : DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE : Dr Christiane COPIE (FISH), Dr Marie-Luce AURIAULT (IHC)
tel secrétariat : 01 49 81 27 28

BON DE DEMANDE D'EXAMEN EN ONCOLOGIE MOLECULAIRE :

PATIENT (ou étiquette à coller)	<input type="checkbox"/> Monsieur	<input type="checkbox"/> Madame
Nom :	Née :	
Prénom :	Date de naissance :	
Adresse (pour facturation):		

PATHOLOGISTE DEMANDEUR

NOM :
ADRESSE:

EXAMEN DEMANDE : Expression de la protéine HER2 (IHC) FISH HER2

MOTIF DE LA DEMANDE : Patient métastatique Oui : Non :
DATE DE LA DEMANDE :

MATERIEL TRANSMIS : DOUBLE DU COMPTE-RENDU A JOINDRE IMPERATIVEMENT A LA DEMANDE

FIXATEUR UTILISE** : Formol Formol neutre AFA Autres (préciser): ** PAS DE BOUIN
DECALCIFICATION : non oui (préciser la méthode) :
Type de prélèvement : Biopsie Pièce opératoire
Site du prélèvement (organe) : Sein Estomac Autre : à préciser
Diagnostic histologique :
Référence Laboratoire : Date du prélèvement :

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREEMENT

1. Bloc paraffine HES
2. IHC HER2 pour les demandes de FISH HER2
3. Compte-rendu histologique et d'immunohistochimie HER2 (en cas de demande de FISH)

CLINICIEN REFERENT (coordonnées précises) : ORDONNANCE A JOINDRE

Nom :
Adresse :

RECOMMANDATIONS DE TRANSPORT ET DELAI DE RENDU DE RESULTAT

Voir fiche pratique

FICHE D'INFORMATIONS PRATIQUES

HOPITAL HENRI MONDOR
51, AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 94010 CRETEIL CEDEX

DEPARTEMENT DE PATHOLOGIE (Pr ES ZAFRANI)

CONTACTS : Dr Christiane COPIE (FISH), Dr Marie-Luce AURIAULT (IHC)

TEL SECRETARIAT : 01 49 81 27 28 / Fax : 01 49 81 27 33

Informations pratiques concernant la recherche d'une surexpression de la protéine HER2 par immunohistochimie (IHC) ou d'une amplification du gène HER2 par hybridation in situ fluorescente (FISH) dans les adénocarcinomes mammaires invasifs

Pour quels patients :

Patientes atteintes de cancer mammaire invasif

Des informations complémentaires sont disponibles sur la fiche médicale « Sein / Adénocarcinome - HER2/surexpressions -HER2/amplifications » de l'APHP.

Dans quels buts :

Définir l'éligibilité à un traitement ciblé par anticorps anti-HER2 (trastuzumab) ou inhibiteur de la kinase de HER2 (lapatinib) :

Seuls les patientes/patients dont la tumeur présente une surexpression de la protéine HER2 (IHC score 3+) ou une amplification du gène HER2 (ratio HER2/CEN17 >2.2) peuvent bénéficier d'un traitement par un agent anti-HER2.

Sur quels prélèvements :

Pièce opératoire ou biopsie de la tumeur primitive, biopsie de métastase souhaitable dans le cas d'un traitement en phase métastatique

Fixée (préférentiellement en formol, le liquide de Bouin est formellement exclu) et incluse en paraffine.

Que faut-il envoyer :

1. **Un bloc tumoral** ayant fait l'objet d'un contrôle histologique morphologique préalable avant envoi pour s'assurer de la cellularité de l'échantillon tumoral, et de la présence d'un contingent infiltrant.

En cas d'analyses moléculaires, le pourcentage de cellules tumorales doit être spécifié dans la demande ainsi qu'une estimation du pourcentage de carcinome in situ, le cas échéant.

2. **Une lame HES** correspondante

3. **Le compte rendu** d'examen anatomo-pathologique

4. **En cas de demande d'analyse FISH, joindre impérativement la lame d'immunohistochimie HER2 et le compte-rendu d'immunohistochimie**

5. Le bon de demande d'examen (téléchargeable sur le site) dûment rempli, comportant notamment les **coordonnées complètes du clinicien demandeur** pour une transmission optimale des résultats.

6. Coordonnées de la patiente (Nom, prénom et adresse de la patiente) pour facturation.

Où adresser sa demande (courrier médical urgent mentionné sur l'enveloppe)

Référent : Dr Christiane Copie (FISH), Dr Marie-Luce AURIAULT (Immunohistochimie)
Laboratoire : Département de Pathologie (RDC haut)
Hôpital Henri Mondor,
51 av du Mal de Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL Cedex
Réception : **01 49 81 27 28 ou 27 32**

→ Le prélèvement sera enregistré dans le logiciel de gestion du laboratoire par le secrétariat.

→ **A réception, la demande est validée par le médecin concerné : en l'absence des documents requis, la demande sera retournée.**

Quelles techniques d'analyse utilisons-nous ?

→ **En première intention** : détection immunohistochimique avec anticorps A0485. Résultats donnés selon les recommandations de l'ASCO (Wolff 2007) :

Score 3+ : Marquage fort et complet > 30 % des cellules, visible au grossissement x 2 ou x 4

Score 2+ : Marquage membranaire faible ou modéré et complet > 10 % des cellules, à l'objectif x 10, confirmé à l'objectif x 20 ou x 40

Score 1+ : Marquage membranaire faible et incomplet > 10% des cellules, confirmé à l'objectif x 20 ou x 40

Score 0 : absence de marquage membranaire ou < 10 % des cellules

→ **En cas de résultat équivoque** de l'IHC (score 2+), une technique d'**hybridation in situ** recherchant l'amplification du gène HER2 sur le chromosome 17, est réalisée.

Résultats donnés selon les recommandations de l'ASCO (Wolff 2007) :

- i. **cas amplifié** : > 6 copies du gène HER2 / noyau (en l'absence de sonde centromérique CEN17 du chr 17) OU un rapport nombre de copies HER2 / nombre de centromères 17 > 2,2.
- ii. **cas non amplifié** : < 4 copies du gène HER2 / noyau OU un rapport HER2 / CEN 17 < 1.8
- iii. **cas demeurant équivoque** : copies HER2>4 mais <6 ou HER2/CEN17>1.8 mais <2.2

Quel est le délai de rendu de l'analyse ?

A partir de la réception du prélèvement, la technique prend en moyenne :

- 7 jours pour l'immunohistochimie (technique groupée)

- 14 à 21 jours pour l'hybridation in situ (technique groupée)

En cas de situation d'urgence, la mention **URGENT** sur le Bon de demande d'examen permet de réduire le délai de rendu au maximum.

Le bloc tumoral vous sera réadressé avec le résultat.

FICHE MEDICALE

Pathologie	Analyse
Sein / Adénocarcinome	HER2(ERBB2) / surexpression - HER2(ERBB2) / amplification

But : Accès à ou poursuite d'une thérapie ciblée

Identifier les patients atteints de carcinome mammaire invasif éligibles pour un traitement par anticorps anti-HER2 (trastuzumab pertuzumab) trastuzumab emtansine ou inhibiteur de la kinase de HER2 (lapatinib)

Seuls les patientes/patients dont la tumeur présente une surexpression de la protéine HER2 ou une amplification du gène HER2 (ERBB2) peuvent bénéficier de ces traitements ciblés.

Indications

Analyse nécessaire : pour tous les cancers du sein invasifs, quel que soit leur stade, le traitement pouvant être prescrit en situation adjuvante (Romond 2005) et métastatique (Slamon 2001)

Analyse recommandée : sans objet

Analyse exploratoire : sans objet

Recommandations générales concernant les prélèvements

ATTENTION : ces informations restent générales et le demandeur d'analyses doit se référer aux « Bon de demande et Fiche d'informations pratiques » avant d'envoyer son échantillon.

- **Nature des prélèvements tumoraux :**
 - pièce opératoire ou biopsie de la tumeur primitive
 - biopsie de métastase souhaitable dans le cas d'un traitement en phase métastatique (pour rechercher un sous-clone différent de la tumeur primitive).
- **Type du prélèvement :**
 - Bloc de paraffine avec tissu fixé au mieux en formol tamponné pendant au moins 6 h pour une biopsie et de 24 h à 48 h pour une pièce opératoire. D'autres fixateurs sont compatibles (AFA). L'envoi de lames non colorées fraîchement coupées (3-4 µm) représentatives et stockées à température ambiante (pour l'IHC) ou au froid (4 °) (pour l'HIS) est possible pour les techniques morphologiques.
 - convient pour l'IHC, et les techniques d'hybridation *in situ* : FISH, SISH et CISH, ainsi que pour (et) les études moléculaires sur l'ADN.
 - congelé (envoi en carboglace)
 - convient pour les études moléculaires sur l'ARN
- **Analyses avant envoi :**
 - Contrôle histologique morphologique préalable avant envoi pour s'assurer de la cellularité de l'échantillon tumoral, et de la présence d'un contingent infiltrant
 - En cas d'analyses moléculaires, le pourcentage de cellules tumorales doit être spécifié dans la demande ainsi qu'une estimation du pourcentage de carcinome *in situ*, le cas échéant.

Principales techniques utilisées et validées

ATTENTION : ces informations restent générales et chaque site d'analyse peut utiliser des techniques qui lui sont spécifiques (cf Fiche d'informations pratiques).

1. **En première intention** : détection immunohistochimique de la surexpression de la protéine HER2 avec anticorps validés dans le cadre de kits approuvés par la FDA (Herceptest (Dako) avec Ac polyclonal A485 et Pathway (Ventana-Roche) avec l'Ac monoclonal 4B5, ou grâce à des techniques calibrées utilisant des anticorps disponibles hors kit dont les plus fréquents sont : A485 et 4B5, ou Ac monoclonal NCL-CB11 (Novocastra), Ac monoclonal SP3 (Microm). Interprétation effectuée sur le contingent invasif uniquement selon les recommandations de l'ASCO (Wolff remise à jour de novembre 2013) avec un résultat sous forme de score:
 - a. **Score 3+** considéré comme positif: >10% de cellules tumorales avec marquage membranaire périphérique total en cadre, d'intensité forte,
 - b. **Score 2+** considéré comme ambigu:
 - ≤10 % de cellules tumorales avec marquage membranaire périphérique total, d'intensité forte
 - > 10% de cellules tumorales avec marquage membranaire incomplet et/ou d'intensité faible/ modérée,
 - c. **Score 1+** considéré comme négatif : marquage membranaire incomplet d'intensité faible dans plus de 10 % des cellules,
 - d. **Score 0** considéré comme négatif : aucun marquage ou marquage membranaire incomplet d'intensité faible dans ≤10 % des cellules.
2. **En cas de résultat ambigu** de l'IHC (score 2+), le statut HER2 doit être vérifié par une seconde technique sur le même prélèvement, en règle générale l'HIS ou par IHC ou HIS si un autre prélèvement est disponible (Wolff 2013) :
 - a. La technique d'hybridation in situ évalue l'amplification du gène HER2 au mieux par technique double sonde en comparaison du centromère du chromosome 17. La FISH est une hybridation *in situ* fluorescente, la CISH est une hybridation *in situ* chromogénique et la SISH est une hybridation in situ métallographique (silver) (Papouchado 2010). Interprétation effectuée sur le contingent invasif uniquement en comptant au moins 20 cellules mais en balayant l'ensemble de la lame à la recherche d'une hétérogénéité et en effectuant une moyenne du nombre de spots observés sur des noyaux non superposés. Résultats donnés selon les recommandations de l'ASCO (Wolff 2013) :
 - i. **cas amplifié** si :
 1. sonde HER2 seule : nombre moyen de copies HER2 ≥6/cell
 2. sondes doubles : sonde HER2 et centromérique sur chr 17
 - a. ratio HER2/CEP17≥2 et nombre moyen de copies HER2 ≥4/cell ou <4/cell
 - b. ratio HER2/CEP17<2 mais nombre moyen de copies HER2 ≥6/cellule sur au moins 20 cellules comptées
 - ii. **cas non amplifié** :
 1. sonde HER2 seule : nombre moyen de copies HER2 <4/cell
 2. sondes doubles : sonde HER2 et centromérique sur chr 17
 - a. ratio HER2/CEP17<2 et nombre moyen de copies HER2 ≥4/cell mais <6/cellule

- iii. **cas demeurant équivoque :**
 1. sonde HER2 seule : nombre moyen de copies HER2 \geq 4 et <6/cell
 2. sondes doubles : sonde HER2 et centromérique sur chr 17 ratio HER2/CEP17<2 et nombre moyen de copies HER2 <4/cell
- iv. Ces cas doivent faire l'objet d'une estimation sur un nombre supérieur de cellules ou sur une lame différente, en comparaison avec la morphologie. Si le cas reste équivoque, la décision de traiter peut être prise en RCP.
- v. Dans de rares cas (epithelioma glandulaire, carcinomes micropapillaires) avec une IHC 1+ (coloration intense mais incomplète (basolateral ou en forme de U) et qui comportent une amplification de HER2. L'ACP doit réclamer le test réflexe. (cf supra).

Expertise recommandée du centre : 250 cas/an pour l'évaluation immunohistochimique, 100 cas /an pour l'évaluation par hybridation in situ avec procédure d'assurance qualité.

- b. Dans certains centres, la technique complémentaire peut être une technique moléculaire par PCR quantitative à la recherche d'une amplification du gène HER2 (Q-PCR) (Bergqvist 2007 ; Jacquemier 2013) ou d'une surexpression du transcrit du gène HER2 (Q-RT-PCR) (Barberis 2008).

Délai moyen de rendu de résultat

7-14 jours

Informations complémentaires

Contexte scientifique :

Le gène HER2 (ERBB2) est situé sur le bras long du chromosome 17 (17q12-21) et code pour un récepteur membranaire de la famille du récepteur de l'EGF ayant une activité tyrosine kinase lorsqu'il se dimérisé. Il active alors des cascades de phosphorylations intracellulaires, induisant la prolifération, la survie, et la mobilité cellulaire et stimulant l'angiogénèse. La protéine HER2 (ERBB2) est surexprimée dans 15 à 20% des cancers du sein, presque toujours en raison d'une amplification du gène HER2 (multiplication du nombre de copies de ce gène). La corrélation entre la surexpression de HER2(ERBB2) au niveau membranaire et l'amplification au niveau génomique est excellente. La qualité de la détermination du statut HER2(ERBB2) est donc essentielle pour la bonne prise en charge des patients ayant un cancer du sein.

Références (sur les indications et les techniques)

1. Barberis M et al
Quantitative PCR and HER2 testing in breast cancer: a technical and cost-effectiveness analysis.
Am J Clin Pathol. 2008 Apr;129(4):563-70.
2. Bergqvist J, et al
Quantitative real-time PCR analysis and microarray-based RNA expression of HER2 in relation to outcome.
Ann Oncol. 2007 May; 18(5):845-50.
3. Jacquemier J, et al SISH/CISH or qPCR as alternative techniques to FISH for determination of HER2 amplification status on breast tumors core needle biopsies: a multicenter experience based on 840 cases.
BMC Cancer. 2013 Jul 22;13:351

4. Papouchado BG et al.
Silver in situ hybridization (SISH) for determination of HER2 gene status in breast carcinoma: comparison with FISH and assessment of interobserver reproducibility.
Am J Surg Pathol. 2010 ;34(6):767-76.
5. Romond EH et al
Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer.
N Engl J Med. 2005; 20;353(16):1673-84.
6. Slamon DJ et al
Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2.
Division of Hematology and Oncology, UCLA School of Medicine, Los Angeles, Calif 90095-1678,
USA. dslamon@mednet.ucla.edu
N Engl J Med. 2001; 15;344(11):783-92.
7. Wolff AC et al.
American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer.
J Clin Oncol. 2007;25(1):118-45.
8. Wolff AC et al.
Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline update.
J Clin Oncol. 2013 Nov 1;31(31):3997-4013
9. Yarden Y
Biology of HER2 and its importance in breast cancer
Oncology 2001, 61 Suppl 2:1-13

Auteurs

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rédacteurs V2 : P. Bertheau, J. Lehmann-Che, M. Marty • Relecteurs : M. Antoine, C. Copie, C. Guettier • Validation Comité de Coordination | le 28/5/2014
le 30/05/2014
le 02/06/2014 |
|--|--|